



Prevención de una infección de la línea central (Broviac®, Port-a-Cath®, PICC) de su hijo


Una infección en la circulación sanguínea se produce cuando las bacterias o los gérmenes pasan a través de la línea central de su hijo a la sangre. Su hijo puede enfermarse gravemente si los gérmenes entran en la circulación sanguínea.

Cuándo preocuparse por si su hijo tiene una línea central infectada:

- Llame a su médico si la fiebre sube a más de 100.4 °F (38 °C) o según se lo indique el médico.
- No administre Tylenol® ni Motrin® hasta que su médico le diga que lo haga.
- Si la piel alrededor de la línea central está enrojecida, hinchada, supura, despidiendo mal olor o está dolorida, llame al médico o enfermera de su hijo enseñada al: () _____

Para prevenir una infección:

- Muestre la tarjeta "This is My Lifeline" (Esta es mi Línea Vital) a los proveedores de atención médica.
- Mantenga el apósito y todas las partes del tubo de la línea secos y limpios.
- Lávese las manos con agua y jabón o utilice un desinfectante de manos a base de alcohol antes de tocar la línea.
- Cerciórese de que los familiares y amigos se laven las manos antes y después de las visitas.
- No permita que nadie cuide de la línea central a no ser que haya recibido capacitación para hacerlo.
- Lleve una mascarilla cuando se cambien el apósito o los tapones de la línea central.
- Use siempre una superficie limpia para los suministros.
- Cambie el apósito si está húmedo, sucio, tiene algún tipo de filtración o empieza a despegarse.



Está bien decir "¡POR FAVOR, lávate las manos!" o "¿te lavaste las manos?"

- Antes de colocar un nuevo apósito, la piel y cualquier parte de la línea debajo del apósito deben frotarse enérgicamente con Chlorhexidine® (clorexidina). Recuerde que debe esperar a que se seque por completo.
- Nunca sople ni airee con la mano para secar la piel después de limpiarla.
- Use un disco medicamentoso (BIOPATCH®) para catéteres implantados (Port-A-Caths®) y catéteres centrales de inserción periférica (PICC).
- Use BIOPATCH® en los catéteres venosos centrales (Broviac®) que no tengan más de una semana.
- Es necesario frotar con alcohol los tapones y las conexiones y dejar secar completamente. Estos DOS pasos son necesarios (pida a su proveedor de atención médica que se encargue de ellos).
- Mantenga el apósito y todas las partes del tubo de la línea secos y limpios.
- No deje que la línea central cuelgue en el baño o en el pañal de su hijo, ni que se caiga al suelo.

Suministros

- Conserve los suministros en un lugar limpio y seco.
- Mantenga los suministros alejados de los niños o mascotas.
- No use los suministros si el envase ya está abierto o se cae el suelo.
- No vuelva a utilizar las jeringas ni las agujas.

Para copias adicionales de este folleto, visite Patient and Family Education A-Z (Educación para el paciente y la familia A-Z) en: children.ucdavis.edu

UC DAVIS
CHILDREN'S HOSPITAL

Children's Miracle Network Hospitals partner 